

# Thuốc tránh thai khẩn cấp là gì

## Thuốc tránh thai khẩn cấp là gì

Kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc là giải pháp tránh thai đạt hiệu quả lên đến 90% trong khoảng 120 giờ (5 ngày) hoặc 72 giờ (3 ngày) tùy kiểu thuốc kháng sinh dưới khi phát sinh quan hệ tình dục không được bảo vệ. Tuy vậy, phụ nữ chỉ cần uống kháng sinh phòng tránh thai trong giới hạn đồng ý, Nếu mà lạm dụng quá nhiều có khả năng bắt gặp tác dụng phụ Với nhiều hậu quả tính mệnh.

Nội dung dưới đây được trả lời tay nghề bởi vì ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo, bác sĩ chuyên khoa Trung tâm sản phụ khoa phòng khám chuyên khoa Tâm Anh TP.HCM sẽ chia sẻ những hiểu biết cụ thể về *Thuốc tránh thai cấp bách*, cách dùng thuốc kháng sinh hợp lý Để hạn chế một số phản ứng phụ nguy hiểm tới tính mạng cũng như chức năng sinh sản của phái đẹp.

## Thuốc ngừa thai khẩn cấp là gì?

Thuốc phòng tránh thai cấp tốc (Emergency Contraceptive Pills) là biện pháp phòng tránh thai được sử dụng sau lúc nảy sinh giao hợp tình dục không an toàn như "yêu" tình dục không được bảo vệ, phụ nữ bị cưỡng hiếp hay liệu có sử dụng giải pháp bảo vệ không giống tuy vậy hoang mang thất bại. (1)

Đối tượng chính của thuốc kháng sinh ngừa thai khẩn cấp đựng hàm lượng rất lớn hormone sinh dục nữ giới Progesterone. Quy tắc phòng tránh thai giống như thuốc kháng sinh tránh thai liên tiếp, song sự khác hàm số lượng Progestin chính là điểm không giống, giúp cho loại thuốc kháng sinh này chặn đoán tác dụng tránh thai nhanh chóng.

ThS.BS Trần Thị Thanh Thảo, bác sĩ Trung tâm sản phụ khoa bệnh viện đa khoa Tâm Anh TP.HCM cho biết, thuốc kháng sinh tránh thai cấp bách là giải pháp hữu hiệu cho các trường hợp "cấp bách" - có nguy cơ mang thai sau lúc phát sinh quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Có 3 nhóm đối tượng lấy thường thấy nhất là:

- Nhóm thứ nhất: cơ thể không thường xuyên quan hệ tình dục, cơ thể không có hoặc chưa thể lấy những giải pháp ngăn ngừa mang thai ngoài mong muốn như sử dụng kháng sinh ngừa thai liên tục, đặt

vòng tránh thai, sử dụng lát dán phòng tránh thai hoặc chưa có sẵn bao cao su...

- Nhóm thứ hai: người bị hiệp dâm hay cưỡng bức tiếp diễn vấn đề quan hệ tình dục cần phải không muốn mang thai.
- Nhóm thứ ba: người đã từng dùng một số giải pháp ngừa thai khác biệt nhưng mà lo sợ thất bại, chẳng hạn như quên dùng kháng sinh phòng tránh thai liên tục, dùng thuốc tiêm ngừa thai nhưng thời gian tiêm bị trễ so với chu kỳ quy định, bao dài su bị thủng hoặc bị rách...

Tìm hiểu cho rằng, thuốc ngừa thai cấp tốc cho kết quả phòng tránh thai lên đến 90% trong khoảng một ngày trước tiên dưới khi phát sinh quan hệ tình dục không được bảo vệ. Nếu như dùng càng muộn sau lúc "làm chuyện ấy" hiệu quả phòng tránh thai càng tổn ít hơn. Tùy dạng thuốc mà hiệu quả ngừa thai sẽ mất đi Nếu như vượt quá thời điểm phỏng đoán phép: 120 giờ (5 ngày) hay 72 giờ (3 ngày). (2)

- [trasparenza.provincia.caserta.it:81/web/suckhoe24gio/home/-/blogs/phong-kham-da-khoa-thai-ha](https://trasparenza.provincia.caserta.it:81/web/suckhoe24gio/home/-/blogs/phong-kham-da-khoa-thai-ha)
- [phòng khám đa khoa thái hà danh sách các phòng khám đa khoa tại hà nội bệnh viện nam khoa ở hà nội bệnh viện chữa yếu sinh lý điều trị xuất tinh sớm ở đâu tốt nhất tại Hà Nội bệnh viện cắt bao quy đầu giá tiền cắt bao quy đầu chữa bệnh trĩ ở đâu tốt phẫu thuật trĩ bao nhiêu tiền phong kham phụ khoa giá khám phụ khoa cách pha thai chi phí nạo hút thai hút thai ở đâu điều trị sùi mào gà ở đâu xét nghiệm sùi mào gà hết bao nhiêu tiền chữa hôi nách ở hà nội phòng khám đa khoa thái hà phòng khám tư nhân phòng khám nam khoa hà nội khám yếu sinh lý ở đâu tốt nhất tại Hà Nội chữa bệnh xuất tinh sớm ở đâu cắt bao quy đầu bệnh viện bình dân chi phí cắt bao quy đầu khám trĩ ở hà nội phẫu thuật trĩ hết bao nhiêu tiền đi khám phụ khoa giá khám phụ khoa phá thai an toàn nhất chi phí phá thai phá thai ở đâu chữa bệnh sùi mào gà ở đâu Điều trị sùi mào gà có tốn kém không khám bệnh lậu xét nghiệm bệnh giang mai ở đâu địa chỉ chữa hôi nách](#)

## **Cơ chế hoạt động của thuốc phòng tránh thai cấp tốc**

Khi được đưa vào cơ thể, những đối tượng nội đào thải liệu có trong thuốc tránh thai cấp tốc sẽ gây ra đe dọa, gây trở ngại quá trình trứng rụng tự nhiên ở nữ, nhờ đó trở ngại quá trình thấy gỡ cùng với tiếp diễn thụ thai giữa trứng cùng với tinh trùng.

Trong tình huống trứng đã thụ thai, kháng sinh sẽ ngăn không cho nội mạc tử cung hình thành cửa sổ làm cho tổ, ngăn cản vấn đề khiến cho tổ của phôi thai trong lòng tử cung. Nếu như việc gây tổ đã từng xảy ra, thuốc kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp không làm dứt quãng việc mang bầu.

Chuyên gia Thanh Thảo nhấn mạnh, nên phân loại điển hình thuốc kháng sinh tránh thai cấp tốc cùng với kháng sinh bỏ thai. Thuốc kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp KHÔNG phải là kháng sinh phá thai. Cơ chế vận động của thuốc kháng sinh tránh thai cấp bách chính là cản trở không cho biết tinh trùng gặp trứng với giải pháp trở ngại việc trứng rụng. Nghĩa là kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc chỉ ngăn cản vấn đề có con, không cần phải kết thúc quá trình mang bầu.

## **Các loại kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc hay gặp Trên thực tế**

Chuyên gia Thanh Thảo cho rằng, thuốc kháng sinh ngừa thai cấp tốc Phát huy hiệu quả phòng tránh thai tối đa Nếu như dùng Tức thì dưới lúc phát sinh "làm chuyện ấy" không an toàn. Ngày nay, Trên đây thị trường thì có không ít dạng thuốc, hay bắt gặp đặc biệt là dạng 72 giờ cùng với 120 giờ, ít thường gặp hơn là một số kiểu một ngày, 36 giờ hay hai ngày. (3)

Các loại kháng sinh ngừa thai cấp tốc được phân kiểu thành kiểu 1 viên hoặc dạng 2 viên, Chính vì vậy phương pháp lấy cũng khác nhau.

### **Thuốc tránh thai cấp tốc loại 1 viên**

Thuốc ngừa thai cấp tốc kiểu một viên được không ít người chọn bởi mức độ thường bắt gặp Trên thị trường cũng như đặc điểm tiện lợi lúc sử dụng. Đa số những viên thuốc kháng sinh dạng này chỉ đạt hiệu quả ngăn ngừa việc mang bầu phía ngoài mong muốn Nếu mà lấy trong tầm 72 giờ (3 ngày) sau khi nảy sinh "yêu" tình dục không an toàn.

Theo khảo sát, thời gian sử dụng kháng sinh càng sớm thì hiệu quả ngừa thai càng lớn. Rõ ràng là:

- Dùng thuốc kháng sinh trong tầm 24 giờ đầu tiên tiên: hiệu quả tránh thai là 90%;
- Từ 25-48 giờ tiếp theo: hiệu quả ngừa thai là 85%;
- Khoảng 49-72 giờ tiếp theo: hiệu quả ngừa thai là 58%;

- Vượt quá 72 giờ: Nếu mà trứng và tinh binh từng thụ tinh và khiến cho tổ trong tử cung, thuốc kháng sinh mất đi tác dụng bảo vệ.

Những nhãn hiệu thuốc kháng sinh tránh thai dạng 1 viên đang thường bắt gặp Trên thị trường gồm:

- Postinor-1®: có thành phần Levonorgestrel hàm số lượng một,5mg, liều dùng 1 viên duy nhất.
- Mifestad 10®: thành phần đựng Mifepristone (chất đối kháng Progestin) hàm số lượng 10mg cho hiệu quả tránh thai an toàn.
- Bocinor®: thành phần Levonorgestrel hàm số lượng một,5mg đóng gói dạng một viên nén/1 vỉ.
- Lys®: chứa Levonorgestrel hàm lượng 0,75mg, thường hay lấy chẩn đoán tình huống không giao hợp thường xuyên hoặc thì có giao hợp tình dục đột bấn.
- Ciel EC 25®: thích hợp kết luận tình huống giao hợp tình dục lần thứ nhất không dùng cách phòng tránh thai, mắc hiếp dâm hoặc cưỡng bức quan hệ tình dục.
- Naphamife®: 1 nhãn hiệu thuốc kháng sinh được sản xuất ở Việt đàn ông, thì có thành phần Mifepristone 10mg Với không ít tá dược.

## **Thuốc ngừa thai khẩn cấp loại 2 viên**

Thuốc kháng sinh phòng tránh thai dạng 2 viên ít hay bắt gặp hơn. Quy phương pháp đóng gói 2 viên thuốc/hộp, từng viên đựng 0,75mg Levonorgestrel. Viên thứ nhất sử dụng càng kịp thời càng tốt dưới lúc phát sinh "làm chuyện ấy" không an toàn, không vượt quá 72 giờ. Viên thứ hai sử dụng dưới viên thứ nhất 12 giờ, không Nhầm quá 16 giờ. Kháng sinh chỉ Phát huy hiệu quả tránh thai khi người dùng uống không thiếu cùng với đúng 2 viên theo thời gian quy tắc.

Những nhãn hiệu kháng sinh ngừa thai cấp tốc kiểu 2 viên hay gặp Vừa rồi thị trường gồm:

- Postinor-2®: Nhãn hiệu thuốc kháng sinh thường bắt gặp nhất, gồm có 2 viên nén chứa thành phần Levonorgestrel hàm lượng 0,75mg tại mỗi viên.
- Happynor®: Nhãn hiệu kháng sinh được sản sinh tại Việt phái mạnh, 1 hộp kháng sinh gồm có 2 viên, mỗi viên đựng hàm số lượng 0,75mg Levonorgestrel.
- Posinight 2®: đối tượng cùng với cơ chế đe dọa giống như 2 nhãn hiệu Trên đây.

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo nhấn mạnh, khi dùng thuốc kháng sinh ngừa thai cấp bách, cơ thể dùng nên biết rõ mình uống loại 1 viên hay 2 viên Để dùng đúng, tránh vấn đề dùng sai lầm khiến cho mất hữu hiệu ngừa thai.

## **Hữu hiệu của thuốc phòng tránh thai khẩn cấp sau khi sử dụng**

Thông thường, nữ giới không có thai Liên sau lúc có "yêu" tình dục. Tinh binh sẽ sống sót trong cơ thể cơ thể nữ giới trong tầm 5 ngày. Tại thời gian đó, Nếu mà tiếp diễn hiện tượng rụng trứng, tinh binh bắt gặp trứng và thụ tinh sẽ cho hiệu quả có thai. (4)

Thuốc ngừa thai cấp tốc thì có vai trò trở ngại việc rụng trứng tự nhiên xảy ra, ngăn không cho biết buồng trứng bắt thích trứng. Hàng đầu Bởi vì thế, Nếu trứng đã từng rụng, trứng cùng với tinh binh đã từng thấy nhau, từng thụ thai và đã khiến cho tổ trong niêm mạc tử cung thì thuốc mất đi chức năng.

Đó chủ yếu là lý do vì sao các bác sĩ y học khuyên rằng phái đẹp cần uống càng kịp thời càng tốt dưới lúc phát sinh quan hệ tình dục không an toàn Nếu như không muốn có bầu.

Tuy nhiên, thống kê cho thấy tầm 1-2% trường hợp chị em phụ nữ lấy kháng sinh tránh thai khẩn cấp vẫn mang thai Mặc dù đã dùng thuốc kháng sinh trong tầm 72 giờ (3 ngày) dưới khi phát sinh "âm trận" tình dục không sử dụng bao cao su.

Có nghĩa là, thuốc ngừa thai cấp bách không bảo vệ tuyệt nhiên được tất cả một số trường hợp có bầu ngoài ý định. Nếu mà sau khi dùng thuốc kháng sinh ngừa thai không thấy xuất hiện "đèn đỏ" đăng nhập những ngày kinh nguyệt tiếp, chị em phụ nữ cần phải thăm khám kịp thời Để được xác định chắc hẳn việc có bầu hay không.

## **Cần sử dụng kháng sinh ngừa thai khi nào?**

Thuốc kháng sinh ngừa thai khẩn cấp cần phải dùng trong các trường hợp nảy sinh giao hợp tình dục không sử dụng bao cao su mà không muốn có bầu. Rõ ràng là:

- Chưa có hay không thể sử dụng cách phòng tránh thai nào.
- Bị hiệp dâm hay cưỡng bức "âm trận" tình dục không được bảo vệ.

- e ngại về chức năng phòng tránh thai thất bại lúc dùng biện pháp phòng tránh thai khác biệt như:
  - Bao dài su mắc rách, thủng, lộn hoặc dùng không đúng biện pháp.
  - Quên dùng kháng sinh tránh thai kết hợp Từ 3 viên trở lên hoặc muộn kinh 3 ngày so đối với chu kỳ bình thường.
  - Trễ 3 giờ so đối với thời gian sử dụng thuốc liên tục chỉ chứa Progestin.
  - Kinh đến muộn 1 tuần với thuốc kháng sinh phòng tránh thai loại tiêm phối hợp.
  - Lột khoảng tránh thai hoặc que cấy ngừa thai nội đào thải tố.
  - Rút "cậu nhỏ" thất bại, như bắn tinh truy cập âm hộ hay Trên bộ phận sinh dục ngoài.
  - Tính toán sai lệch thời điểm kiêng cử.

## Những phản ứng phụ khi sử dụng thuốc kháng sinh tránh thai khẩn cấp

Chuyên gia Thanh Thảo cho thấy, Dù cho kháng sinh tránh thai khẩn cấp đạt hiệu quả tránh thai nhanh chóng và hữu hiệu lên tới 90%, song Nếu như lấy sai biện pháp hoặc lạm dụng kháng sinh có thể gây ra không ít phản ứng phụ, nhiều ngày có khả năng gây nên rất nhiều hậu quả trầm trọng chi phối tới sức khỏe người dùng.

Một vài phản ứng phụ thường bắt gặp của kháng sinh ồm:

- Rối loạn những ngày kinh nguyệt nguyệt: Là phản ứng phụ phổ biến nhất, có thể xuất hiện Tức thì Từ lần đầu tiên uống thuốc kháng sinh phòng tránh thai hay dưới nhiều lần uống. Chị em có thể thấy "đèn đỏ" đến kịp thời hơn hoặc muộn hơn so với chu kỳ thông thường. Nếu như muộn hơn 1 tuần, chị em phụ nữ nên dùng que thử hay xét nghiệm đối với chuyên gia Để được khiến các thăm khám cần thiết, định vị chắc chắn vấn đề mang bầu hay không.
- Chảy máu dạ con bất thường: một vài tình huống chị em phụ nữ bị chảy máu sau dùng thuốc kháng sinh, Cụ thể là tác dụng phụ sẽ mau chóng không còn nữa. Nếu mà dưới 2 hôm vẫn bị chảy máu, phụ nữ cần phải thăm khám Tức khắc Để kiểm tra khả năng bị bệnh lý nặng.
- Chóng mặt, mót nôn, nôn: khoảng tầm 50% trường hợp mắc phải tình trạng này, tuy nhiên chị em phụ nữ không nên lo sợ, biểu hiện sẽ tự biến mất dưới 1-2 tuần hay sớm hơn. Nếu như dưới thời gian Trên biểu hiện không cải thiện, chị em phụ nữ nên xét nghiệm Để xác định

nguyên do tiềm ẩn khác biệt.

- Đau bụng dưới: Số ít tình huống bị phải dấu hiệu nhận biết đau bụng dưới dữ dội. Trong trường hợp này, nữ giới cần phải xét nghiệm kịp thời Để định vị nguyên nhân chính xác của triệu chứng, dạng trừ nguyên nhân mang bầu ngoài tử cung – một biến chứng có nguy cơ mắc phải Nếu ngừa thai bất thành với cách dùng thuốc tránh thai cấp tốc.
- Trường hợp lạm dụng thuốc kháng sinh quá mức làm cho người không dung nạp thuốc kháng sinh có nguy cơ khiến cho phái đẹp gặp các tác dụng phụ kéo dài không giống như stress hoặc trầm cảm, Nâng cao cân không kiểm soát, mất cân bằng huyết áp cũng như hô hấp...

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo khuyên rằng chị em phụ nữ tránh lạm dụng uống kháng sinh ngừa thai cấp bách, chỉ sử dụng trong trường hợp thật quá trình cần thiết. Tốt nhất cần phải vận dụng ý kiến bác sĩ Để được tư vấn, hướng dẫn cách tránh thai phù hợp và an toàn.

## **Ai có khả năng uống kháng sinh ngừa thai khẩn cấp?**

Hầu hết chị em phụ nữ Thường xuyên có thể lấy thuốc tránh thai cấp tốc, gồm những trường hợp chưa thể lấy giải pháp phòng tránh thai nội tiết tố như kháng sinh ngừa thai liên tục hay miếng dán ngừa thai.

Nhưng, nữ giới không nên uống thuốc ngừa thai khẩn cấp Nếu dị ứng đối với bất kỳ thành phần nào của thuốc, hoặc mắc bệnh lý có khả năng tương tác đối với thuốc kháng sinh. Thông báo tình trạng bệnh lý hoặc dị ứng với bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ Để được tư vấn dùng thì có an toàn hay không.

## **Những trường hợp chống chỉ định đối với thuốc kháng sinh tránh thai cấp bách**

Bác sĩ chuyên khoa Thanh Thảo nhấn mạnh, một số tình huống bài viết này không nên dùng kháng sinh phòng tránh thai cấp tốc, bao gồm:

- Chị em phụ nữ đang mang thai hay nghi ngờ mang thai;
- Nữ giới xuất hiện hiện tượng ra máu âm đạo thất thường mà không Rõ rệt nguyên nhân;

- Chị em liệu có tiền sử bệnh nhiễm tắc mao mạch hoặc bệnh huyết khối.

Một số tình huống nên thận trọng lúc uống thuốc phòng tránh thai, tốt nhất nên thông báo với bác sĩ chuyên khoa hay dược sĩ Để được tư vấn kỹ, gồm:

- Nữ bị bệnh tiểu đường thì có biến chứng;
- Phái đẹp có tiền sử biến đổi lưu thông máu não;
- Nữ giới mắc bệnh tim mạch, căn bệnh động kinh...

## **Một số lưu ý khi sử dụng thuốc kháng sinh tránh thai khẩn cấp**

Thuốc kháng sinh tránh thai cấp tốc thì có hai mặt lợi và hại cụ thể, Bởi vì thể chị em phụ nữ cần phải trang bị cho biết chính mình một số hiểu biết về cách lấy Nhằm bảo vệ sức khỏe bản thân. Sau đây là các chú ý lúc uống thuốc phụ nữ cần phải biết:

- Chỉ uống kháng sinh trong trường hợp thực quá trình quan trọng. Đọc kỹ càng chỉ dẫn dùng hoặc vận dụng ý kiến bác sĩ, dược sĩ trước lúc dùng. Không uống quá 2 lần/tháng và 3 lần/năm Để hạn chế tác động tới chức năng có con của nữ.
- Cần phải sử dụng thuốc kịp thời nhất sau lúc phát sinh "yêu" tình dục không sử dụng bao cao su Nhằm cho kết quả tránh thai lớn nhất.
- Uống rất nhiều viên kháng sinh phòng tránh thai khẩn cấp không làm cho Nâng cao hiệu quả phòng tránh thai, Bên cạnh đó Tăng khả năng gặp tác dụng phụ nặng nề do cơ thể không hấp thụ thuốc. Bởi vì thế, phụ nữ chỉ cần uống đầy đủ cũng như đúng theo khuyến rằng.
- Không uống kháng sinh trong các trường hợp đang mang thai hay nghi ngờ mang bầu, đang chữa bệnh lý như đái đường, tim mạch, động kinh, mất cân bằng lưu thông máu não...
- Trong trường hợp gặp tác dụng phụ dưới dùng thuốc, Nếu như những triệu chứng lâu ngày đối với tần suất thất thường, phái đẹp cần kiểm tra Ngay Để kiểm tra các trường hợp bệnh lý trầm trọng.

## **Một vài bản khoản hay bắt gặp**

**1. Dùng thuốc ngừa thai khẩn cấp thì có mang bầu không?**



Không có 1 giải pháp ngừa thai nào đạt kết quả phòng tránh thai 100%.  
Tìm hiểu cho thấy, tầm khoảng 1-2% trường hợp vẫn mang bầu Dù sử dụng thuốc tránh thai Tức khắc dưới lúc "làm chuyện ấy" tình dục không sử dụng bao cao su.

Chính vì vậy, dưới lúc sử dụng kháng sinh, Nếu như có cảm giác "đèn đỏ" đến chậm hơn 7 ngày so với vòng kinh thông thường, phái đẹp cần lấy que thử thai hoặc xét nghiệm đối với chuyên gia Nhằm được làm các kiểm tra cấp thiết, xác định chắc chắn thì có có bầu hoặc không.

## **2. Uống thuốc kháng sinh phòng tránh thai cấp bách liệu có ảnh hưởng khả năng mang thai về sau không?**

Cơ chế vận động của kháng sinh là cản trở quá trình rụng trứng thiên nhiên, không khiến cho đứt quãng quá trình phát triển của phôi thai trong tình huống trứng đã thụ thai cùng với làm tổ trong niêm mạc tử cung. Chủ yếu Vì thế, kháng sinh tránh thai khẩn cấp không khiến cho đe dọa đến khả năng mang bầu của chị em phụ nữ sau này.

## **3. Làm thế nào Nhằm biết thuốc ngừa thai cấp tốc liệu có hiệu quả hay không?**

Dưới lúc sử dụng kháng sinh, Nếu mà xuất hiện "rụng râu" vẫn thấy như các chu kỳ bình thường, Đó là triệu chứng phòng tránh thai thành công. Nhưng, Để có kết quả chắc chắn, phái đẹp cần đợi ít nhất một số tuần, Rồi sử dụng que thử thai Để kiểm chứng tránh thai thành công hoặc không.

## **4. Liệu có cần uống rất nhiều viên thuốc ngừa thai cấp bách Nhằm Tăng hiệu quả tránh thai không?**

Lời giải đáp là không. Dùng nhiều viên Cùng với lúc không khiến cho Tăng hiệu quả tránh thai, Ngược lại còn làm cho Tăng nguy cơ gặp rất nhiều phản ứng phụ nặng bởi cơ thể không thể hấp thu. Không ít trường hợp dùng quá nhiều kháng sinh có khả năng thấy biểu hiện không dễ chịu tại dạ dày. Khuyến rằng chỉ cần phải dùng tối đa 2 viên/tháng hoặc 3 viên/năm Nhằm giữ gìn không ảnh hưởng đến khả năng có con của nữ.

Trường hợp mắc nôn dưới lúc uống kháng sinh, nên xem xét thời điểm nôn sau khi sử dụng thuốc kháng sinh bao lâu. Nếu như bị nôn trong khoảng 1 giờ, phụ nữ có khả năng dùng thêm một viên Nhằm đảm bảo hiệu quả phòng tránh thai.

## 5. Khi nào cần đến gặp bác sĩ?

Sau khi uống thuốc ngừa thai, Nếu như gặp phải bất kỳ triệu chứng nào bài viết này, phụ nữ cần đến Túc khắc bệnh viện Để được bác sĩ kiểm tra cũng như giải quyết sớm. Những biểu hiện cần phải đặc biệt lưu ý gồm:

- Nhức đầu, chóng mặt, kém hoặc bị tê;
- Nhạt mắt, suy giảm thị lực, nói chuyện không dễ khăn;
- Cảm giác đau ngực, khó khăn thở;
- Đau bụng nặng;
- Cảm giác đau không ít ở bắp chân hay đùi.

Cho dù là giải pháp phòng tránh thai hữu hiệu cho biết những trường hợp “cấp bách”, nhưng thuốc tránh thai khẩn cấp cũng là “con dao hai lưỡi”, có khả năng gây nên nhiều hệ lụy nguy hiểm nặng nề đến tính mệnh và khả năng có con của nữ giới. Hàng đầu Vì vậy, nữ giới không nên dùng quá nhiều thuốc kháng sinh. Tham khảo ý kiến chuyên gia Để được tư vấn phương pháp phòng tránh thai hiện đại thích hợp cùng với an toàn.

Trung tâm sản phụ khoa hệ thống địa chỉ y tế Tâm Anh hội tụ hệ thống chuyên gia sản phụ khoa giỏi trình độ, dày dặn kinh nghiệm sẵn sàng đi cùng Cùng với nữ giới trong phục vụ tính mạng có con cũng như dự định hóa gia đình.